



2006年1月10日

株式会社三和化学研究所  
代表取締役社長山本一雄

## 糖尿病食後過血糖改善剤「セイブル<sup>®</sup>錠」の新発売について

株式会社三和化学研究所（本社／名古屋、社長／山本一雄、スズケングループ）は、糖尿病食後過血糖改善剤「セイブル<sup>®</sup>錠 25mg、50mg、75mg」（一般名：ミグリトール）を、平成18年1月11日より新発売いたしますのでお知らせいたします。

「セイブル<sup>®</sup>錠」は、 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬に分類される食後高血糖に対する治療薬であり、食直前に服用することで糖質の消化・吸収を遅延させ、食後の血糖上昇を『早く』『強く』抑制することを特長としております。その結果、食後のインスリン分泌を節約して膵臓の細胞の負担を和らげる、膵臓に「やさしい」薬剤でもあります。

近年のライフスタイルの変化にともない糖尿病患者さんが大変増加しております。最近のスタディーでは、食後高血糖は、動脈硬化性疾患のリスクであることが明らかにされており、動脈硬化性疾患の予防のためにも、早期糖尿病の段階から食後高血糖の治療を開始することが求められております。また、早期糖尿病では食後2時間ではなく1時間で食後血糖値のピークが見られるため、従来の食後2時間血糖値に加え食後1時間血糖値の治療標的としての重要性も示唆されています。このように、より厳格な血糖管理を目指すために、食直後の血糖コントロールは、治療戦略上の重要なポイントとして注目されています。

糖尿病の進展、ならびに心筋梗塞、脳卒中などの動脈硬化性疾患の発症に対して、食後高血糖の重要性が明らかになるなかで、食後早期の血糖上昇を強くおさえる本剤の特性が糖尿病患者さんの治療と生活に大きく貢献できるものと確信しております。

尚、本剤は、大日本住友製薬株式会社（本社／大阪、社長／宮武健次郎）と共同で情報提供活動を行います。

## 新製品概要

- 【剤名】糖尿病食後過血糖改善剤
- 【品名】セイブル<sup>®</sup>錠 25mg、50mg、75mg（成分名：ミグリトール）
- 【薬価】錠 25mg：32.60 円、  
錠 50mg：57.60 円  
錠 75mg：80.30 円
- 【効能・効果】2 型糖尿病の食後過血糖の改善  
（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）
- 【用法・用量】通常、成人にはミグリトールとして 1 回 50mg を 1 日 3 回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら 1 回量を 75mg まで増量することができる。
- 【製造・販売】株式会社三和化学研究所
- 【備考】プロモーション提携：大日本住友製薬株式会社

お問い合わせ先  
株式会社 三和化学研究所  
東京事務所広報担当 宮原  
TEL03-3232-2601