目と健康シリーズ

No.23

Eye & Health

特集:目の外傷



監 修:堀 貞夫先生(東京女子医科大学名誉教授、

済安堂井上眼科病院顧問、

西新井病院眼科外来部長)

特集編集: 稲富 誠先生 (昭和大学名誉教授)

特集:目の外傷

編集 昭和大学名誉教授 稲富誠先生

エ〜ン。目が痛くてあけられないよ〜。お風呂掃除の洗剤が目に入っちゃったの。せっかくママのお手伝いしてたのにィー。エ〜ン!



目のけがの応急手当て

それでは最初に、目をけがした場合の一般的な対処法をお話しします。なお、症状が目以外にも及ぶような場合には、ここに示す内容にとらわれず、すぐに救急外来を受診するか救急車を呼んでください。

A. 液体や粉末状のものが目に入ったとき

例)洗剤、漂白剤、カビとり剤、接着剤、 ヘアカラー、石灰(白線引き用など)、セ メント、薬品など

①直ちに水で十分に洗眼する

なによりもすぐに目を洗うことです。最低10分以上、蛇口の水やヤカンに汲んだ水を目に直接かけるか、洗面器に張った水で目をよく洗ってください。目をつぶっていては効果がないので、痛くてもがまんして目をあけて洗眼してください。

この間、目をこすってはいけません。

②近くの眼科医に連絡をとる

洗眼の開始とともに、周囲の人が(1人の場合は自分で)近くの眼科に電話をして 状況を説明し、指示を受けてください。

③眼科を受診

洗眼が済んだらすぐに、連絡をとった眼 科医や眼科救急外来を受診してください。

B. 固形物が目に入ったとき

例)なにかの作業中に鉄片、木片、プラス チック片が飛んできて目に入った。カッタ ーで目を傷つけた。針が目に刺さった

眼球や目の回りを切ったり刺したとき

①付着物を水で洗い流す

目の表面や周囲によごれ(例えば泥)がついている場合は、すぐに水でそれを洗い落とします。ただしAのケースほど長時間続ける必要はありません。また、眼球に大きな傷がある場合は無理に目を開かずに、軽くよごれをとってください。

この間、目を押さえつけてはいけません。 出血している場合は、きれいなタオルやティッシュなどをまぶたの上から軽く当てて ください。

付着物がない場合はすぐに②へ。

②眼科医に連絡をとって受診する

近くの眼科に電話をして状況を説明してください。応急処置の指示を受け、それが済んだら直ちに受診してください。

C. 眼球や目の回りを打撲したとき

例) 球技のボールが目に当たった、格闘技中の事故

- ・視力低下や視野の異常、眼痛などの自覚 症状がある→眼科救急外来を受診
- ・これといった自覚症状はない→念のため 眼科を受診し精密検査を受ける

D. 理由は思い当たらないが目が痛いとき

- ・視力低下や視野の異常、または頭痛や吐き気などを伴う→直ちに眼科を受診
- ・眼痛以外の症状はない→眼科を受診

■受診する際に医師に伝えるポイント■

一刻を争う状況のなかで正確な診断・的確な治療を素早く行うために、以下のような事項を眼科医に 伝えるように努めてください。

□できるだけ詳しい受傷時の状況

- ・目に物が入った場合、なにがどの程度入ったのか
- ・打撲の場合は当たった物(ボールであればその 種類〈野球ボールかサッカーボールかなど〉、 固さ、飛んできた方角・スピード)、当たった 瞬間の姿勢
- ・格闘技の場合は相手のどの部分が、どのような 動きのなかで、どこにあたったのか
- □何分前に受傷したのか
- □メガネやコンタクトレンズをしていたか
- □どのような応急手当てをしたか
- ◆目に洗剤や薬品などが入った場合は、それがなにかわかるもの(容器や説明書)を持参してください。 固形物の場合、破片が残っていれば、それを持参してください。

的確な初期治療までのスピードが命

さて、ここまで緊急時の応急手当てを大 急ぎで解説してきましたので、ここからは 目のけが「眼外傷」について、腰を落ち着 けてお話ししたいと思います。

大切な組織を一瞬で損傷してしまう

眼球は奥行き24ミリメートル程度の球形の小さな器官です。しかしその小さな眼球には、物を見るうえで欠かせないいくつもの組織が精巧に組み込まれています。それらのなかには、いったん損傷すると再生しなかったり、再生しても元のようには働かない組織もあります。

皮膚をけがした場合は、たとえ傷あとが 残るとしても、機能的な問題はなく治ることが多いですが、目に限っては以上の理由 で、そうもいかないことがあるのです。し かも、例えばなにかが刺さった場合に、大 切な複数の組織をいっぺんに壊してしまう こともあるなど、一つのトラブルが多大な 影響を及ぼすことが少なくありません。

自覚症状が軽くても必ず診察を受ける

眼外傷の治療で大切なことは、受傷後に可能な限り早く正しい応急手当てを施すことです。手当てを開始するまでの1分1秒の差が、視機能を大きく左右することも珍しくありません。

症状が軽いからといって診察を受けずに 放置していると、治療のタイミングを逃し て、取り返しのつかないことになりかねま せん。片方の目に異常があっても、ふだん は両目で物を見ているので、視力低下や視 野の異常に気付かないことがあります。で すから自覚症状は、片目をふさいで必ず左 右別々にチェックしてください。

救急治療とは、損傷箇所の修復(手術)と感染防止

眼外傷ではまず、損傷した組織を修復したり、入り込んだ異物を取り出す緊急治療をします(手術など)。傷のある場合には同時に抗生物質などを十分に使って、細菌やウイルスに感染しないよう厳重に注意します。重度の外傷の場合、まずこのような救急治療を行い、しばらく経過し状態が安定してから、もう一度手術を行って組織をきちんと修復し、視機能の回復を図る場合も多くあります。

■眼外傷の検査■

的確な治療には、けがの状態を正しく把握するための検査が欠かせません。しかし、検査に時間をとられて治療が遅れてしまっては元も子もないので、治療を進めながら必要な検査を並行して行うことになりまる。視力や視野・眼圧測定、顕微鏡検査など基本的な検査のほか、X線やCT・超音波などの画像検査が、骨折の診断や出血のために内部をよく観察できない状況での診断に、しばしば威力を発揮します。



眼窩底骨折のCT写真 (矢印が骨折部。 6ページ参照)

部位別にみる眼外傷


(必要に応じて、このシリーズのNo.1をご参照ください)

かくまくけつまく角膜・結膜


角膜は黒目の部分の透明な膜状の組織で、眼球内部と外部とを隔てるとともに、光を屈折させるレンズとしての大切な役割をもっています。結膜は眼球の白目の部分とまぶたの裏側に広がっている膜で、白目の表面を覆っています。

受傷の原因 なにかの液体が目にかかる、 固形物が飛んできて目に入る、刃物で切る、 物を突き刺す、ペットに引っかかれる、コ ンタクトレンズの不適切な使用、ゴーグル をせずにスキーをしたあとなどの光線外 傷、打撲、ほか。


症状・経過 強い痛みを生じます。組織が



再生されれば痛みはとれますが、再生の過 程で角膜の表面が凸凹になったり濁りを生 じると、視力が低下します。また傷が角膜を 貫通した場合、 房水*1が外に流れ出てしま い、眼圧*2が低下します。このほか、瞼結 膜と球結膜のすき間に異物が入り込んでし まったり、結膜下出血などがよく起こります。 ※1 房水: 眼球の前部 (前房) を満たす水分。 毛様 たい 体で作られ、隅角から排出されています。房水が多 すぎると高眼圧、少なすぎると低眼圧になります。 ※2眼圧:眼球の内圧、つまり眼球の硬さ。眼圧が低 すぎると眼球のかたちを維持できずに眼球が萎み、眼 圧が高すぎると視神経などの構造的に弱い部分が障 害され、長期間続くと緑内障という病気になります。 治療 薬品や化学物質などによる外傷は、 なによりもまず十分に洗眼することが大切 です。とくにアルカリ性のものは組織を溶 かしながら内部へ侵入していくので受傷直



角膜異物 (鉄粉)



後の十分な洗眼が必要で、洗眼の十分さが 予後を決めるといっても過言ではありません。物が刺さった場合はそれを除去し、深い切り傷や刺し傷は縫合します。救急治療 後は治療用のコンタクトレンズを装着し角膜が再生するのを待ちます。角膜の濁りが強く残った場合は、角膜移植を検討します。なお、打撲などによる結膜下出血はふつう時間がたてば自然に出血が引いて治ります。

水晶体・毛様体・虹彩

水晶体は透明で弾力性のあるレンズです。水晶体の周囲を毛様体小体が取り囲んでおり、これは毛様体につながっています。毛様体筋の力で毛様体小体がゆるんだり緊張することにより水晶体の厚みが変わり、網膜にピントを合わせています。毛様体は房水の産生も担っています。虹彩は水晶体の手前に輪状に広がっている組織で、中央の穴「瞳孔(ひとみ)」の大きさを変化させ、周囲の明るさに応じて眼球内に入る光の量を調節するという、カメラの絞りの役目をもっています。

受傷の原因 固形物が飛んできて目に入る、打撲、物を突き刺す、ほか。

症状・経過 虹彩や毛様体が損傷を受ける と出血を生じ前房(角膜と虹彩の間のスペ ース) が濁ってしまう前房出血を生じます。 水晶体の位置がずれてしまったり、水晶体 が濁る外傷性白内障が生じると視力が低下 します。また、隅角(角膜外縁部の裏側と虹 彩の間のすき間。房水の排出口) が損傷さ れると、低眼圧が起きることもあります。 治療 入り込んだ異物を取り出したり、損 傷した虹彩や毛様体を修復する手術を行い ます。水晶体の位置のずれや白内障に対し ては、眼内レンズに置き換える手術で視力 回復を図ります。前房内への出血は通常、 数日で血液が吸収されて濁りは消えます。 しかし血液が長く引かない場合は角膜に色 がついてしまい、出血が引いても視力が回 復しなくなる可能性があるので、前房内を 洗浄する手術を行います。

網膜・硝子体

網膜は眼底に広がっている視細胞を含む 大切な組織で、カメラのフィルムに該当し ます。硝子体は眼球の内部の大部分を占め ている無色透明のゼリー状の組織で、眼球 のかたちを内側から支えています。硝子体 の表面は網膜に接しています。

受傷の原因 固形物が飛んできて目に入る、物を突き刺す、打撲、ほか。

症状・経過 網膜に損傷を生じたり、出血したり、網膜が剝離すると、その部分は光を感知できないので、視野が欠けたり視力が低下します。打撲の場合は網膜にむくみが生じて、その部分に相当する視野が障害されます(網膜振盪症)。網膜からの出血が網膜上や硝子体内に広がる硝子体出血の場合も、同様の症状が現れます。

治療 手術を行い、濁った硝子体を取り除き、網膜の亀裂や剝離を修復したり、異物がある場合はそれを取り出します。硝子体出血は軽ければ数日から数週間で吸収されますが、重傷のときは硝子体手術※3を行うこともあります。障害が硝子体出血だけの場合は手術でよくなりますが、網膜に損傷が及んでいる場合は症状が残ることがあります。打撲による網膜振盪症は数カ月で自然に治

ることが多いですが、黄斑(網膜の 眼底中央にあたるくに鋭敏な範囲)が、覚敏な範囲と、 が時間で、視力がといいですがでい。 がではいいですができます。 がはいいですのののでは、 ではいいですののです。 はいいですののでは、 はいいですののです。 はいいですののです。



外傷性網膜出血、網膜振盪症

※3硝子体手術:硝子体内の異物や出血を取り除いて透明にしたり、網膜裂孔・剝離や黄斑円孔・ 浮腫などの治療のための硝子体切除を伴う手術。

強膜・脈絡膜

強膜は眼球の一番外側の大部分を覆って いる厚い丈夫な外膜で、眼球内部を保護し ています。 *脈絡 に強膜と網膜 の間にある膜で 血管に富み、網膜 の一部に酸素 や栄養を供給し でいます。



強膜裂傷(刺傷)

受傷の原因 物を突き刺す、固形物が飛んできて目に入る、打撲、ほか。

症状・経過 強膜や脈絡膜が受傷したときは他の組織も損傷していることが多く、それによって症状が異なります。強膜を貫通しているときには脈絡膜や硝子体が外に出てきて眼圧が低下したり、重度の場合は眼球が破裂することもあります(強膜裂傷)。治療 手術によって損傷箇所を縫合し、損傷した硝子体や脈絡膜を切除・修復します。眼球が破裂した場合もできるだけ修復を試みますが、重傷で修復不能のときは、最終的に眼球を摘出することもあります。

まぶた (眼瞼)

受傷の原因 なにかの液体が目にかかる、物が突き刺さる、やけど、刃物で切る、ペットに引っかかれる、打撲、ほか。

あふれて止まらな くなります。

治療 急いで損傷 箇所の縫合・形成、 涙小管の修復を 行います。治癒の



涙小管断裂

過程でまぶたのかたちが変わってくることがありますが、そのときは再手術をします。

がんか眼窩

眼球が収まっている頭蓋骨の凹みを脱瀉 といいます。眼球を動かす筋肉、血管、眼球と脳を結ぶ視神経などを保護しています。 受傷の原因 打撲、ほか。

症状・経過 眼窩底の骨が折れる眼窩底骨折では、眼球を動かせなくなり物が二重に見えます。外傷性視神経損傷(眼球から脳へ通じている視神経の損傷。眉毛の耳側の端を打ったときに起こりやすい)では、視力低下や視野欠損、視界が暗くなるといった症状が現れます。

治療 眼窩底骨折は手術を行います。視神経損傷には、ステロイド薬で炎症を抑える治療法(薬物療法)と、視神経が通っている視神経管という骨を削って、圧迫されてむくんでいる神経の負担を減らす手術があります(手術療法)。視神経の障害は時間が経つほど回復が難しくなるので、いずれの治療も早期に行わねばなりません。

注意が必要な合併症

外傷の傷そのものは治ったとしても、治療の途中または治ったあとに合併症が起き、視覚障害に至ることが多くあります。合併症の予防・早期発見のため、必ず医師の指示に従って通院を続けるとともに、異常を感じたらすぐに受診してください。

角膜潰瘍 角膜にできた傷口から入り込ん だ細菌が周囲に広がって潰瘍になり、視力 が低下します。

■子どもの眼外傷■

子どもはけがをしても、いつどのような状況で受傷したのかはっきりいえません。また視力や視野の異常があっても黙っていることが多く、検査もすんなりとはいきません。しかも視機能の発育段階にあるので、小さなけがでも早く治療しないと、弱視になる可能性があります。このようなことから正確な診断がいっそう大切で、場合によっては、外見は問題なさそうに見えてもいったん入院してもらい、麻酔をして検査することもあります。





右眼の眼窩底骨折で右目が上に向かない状態。物が二つに見えます。

外傷性白内障 打撲の衝撃や刺傷などによって水晶体の組織に乱れが生じると、白内 障が短期間で発症・進行し視力が低下しま す。

緑内障 隅角の損傷などで房水の排出経路が塞がれると、高眼圧になって視神経が圧迫される緑内障になり、視野が欠けてきます。

網膜裂孔・網膜剝離 受傷後、網膜に亀裂

ができて剝離することがあり、視野の障害、 視力低下が起きます。早急な手術が必要で す。

黄斑円孔。黄斑に外力が及ぶと小さな円孔。 があきます。黄斑は物を見るうえで最も大 切な部分なので、視力が低下します。

眼内炎 細菌感染が眼球内部へ及び、重症 の炎症を起こすことがあります。細菌にと って眼球内は最適な生存環境なため、病気 の進行は早く、治療を急がなければいけま せん。治療が遅れると失明します。

交感性眼炎 非常にまれですが、片方の眼 が裂傷などで、ぶどう膜(虹彩・毛様体・ 脈絡膜など)の損傷を受けると、受傷から 数カ月~数年以上あとに、もう一方の眼に 炎症が起きることがあります。

■治療の経過は千差万別■

眼外傷の経過は千差万別で、同じケースは一つと してないといわれます。たとえ全く同じボールが同 じように当たっても、受傷の瞬間のほんのわずかな 違いが、大きな差異につながるのです。このため視 力や視野の予後はケースバイケースで、いちがいに 判断することはできません。損傷の程度、受傷から 治療開始までに要した時間、合併症の有無などに よって、視機能の予後が大きく左右されます。





アイはあれからすぐに水で目を洗って目医者さん に行ったの。おかげでちゃんと治ったヨ! でもお手伝いは当分お休みにしよっと。

・特集テーマー覧

目で見る眼の仕組みと病気 No. 1 No. 2 糖尿病網膜症 No. 3 糖尿病黄斑症 No. 4 高血圧網膜症

No. 5 網膜静脈閉塞症 No. 6 網膜動脈閉塞症 No. 7 加齢黄斑変性

No. 8 No. 9

No.10 No.11

No.12

色覚の異常 No.13

No.15 屈折異常・調節異常 No.16 子どもの目の病気

中心性漿液性脈絡網膜症 網膜色素変性症 緑内障 白内障 No.27 網膜裂孔·網膜剝離 No.14 ドライアイ

No.17 結膜炎 No.18 角膜の病気 No.19 ぶどう膜炎 No.20 黄斑円孔・黄斑前膜 No.21 眼の神経の病気

No.22 涙道や涙腺やまぶたの病気 No.23 目の外傷

目の病気の手術治療 No.24 No.25 目の病気の薬物治療 No.26 バセドウ病と目の病気

まぶたの病気と QOL No.28 眼精疲労 No.29 アレルギーによる目の病気

No.30 コンタクトレンズ No.31 飛蚊症

-ビジョンケア No.32 T

目と健康シリーズ No.23

特集: 目の外傷

2012年2月改訂

後

修:堀 貞夫 先生

(東京女子医科大学名誉教授、 済安堂井上眼科病院顧問、 西新井病院眼科外来部長)

特集編集:稲富 誠 先生 (昭和大学名誉教授)

企画·制作:株式会社 創新社 東京都港区西新橋 2-8-11 〒 105-0003

援:株式会社 三和化学研究所

名古屋市東区東外堀町 35 番地 〒 461-8631