

ウパシタ 静注透析用 25 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 50 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 100 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 150 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 200 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 250 μ g シリンジ
 ウパシタ 静注透析用 300 μ g シリンジ

【この薬は？】

一般名
ウパシカルセトナトリウム水和物 Upacicalcet Sodium Hydrate

販売名	含有量 (1 シリンジ中 ウパシカルセトナト リウムとして)
ウパシタ 静注透析用 25 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 25 μ g Syringe for Dialysis	25 μ g
ウパシタ 静注透析用 50 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 50 μ g Syringe for Dialysis	50 μ g
ウパシタ 静注透析用 100 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 100 μ g Syringe for Dialysis	100 μ g
ウパシタ 静注透析用 150 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 150 μ g Syringe for Dialysis	150 μ g
ウパシタ 静注透析用 200 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 200 μ g Syringe for Dialysis	200 μ g
ウパシタ 静注透析用 250 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 250 μ g Syringe for Dialysis	250 μ g
ウパシタ 静注透析用 300 μ g シリンジ UPASITA IV Injection 300 μ g Syringe for Dialysis	300 μ g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、カルシウム受容体作動薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用することにより、副甲状腺ホルモンの分泌を抑えます。
- ・次の病気の人に、医療機関において使用されます。

血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にウパシタ静注透析用シリンジに含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・低カルシウム血症の人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬を使用する前に、血清カルシウム濃度などを確認するために、血液検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

- ・この薬は注射薬です。
- ・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて医師が決め、医療機関において返血時に透析回路静脈側に注入されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用により、低カルシウム血症（指先や唇のしびれ、けいれん）があらわれることがあります。低カルシウム血症があらわれたり、あらわれるおそれがある場合には、この薬の使用量を減らしたり、カルシウム剤やビタミンD製剤を使用することがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使うことができません。
- ・授乳している人は授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- ・この薬の使用中には、血清カルシウム濃度、副甲状腺ホルモンを確認するために、定期的に血液検査が行われます。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低カルシウム血症 ていかるしうむけっしょう	指先や唇のしびれ、けいれん
QT延長 きゅーていえんちょう	めまい、動悸（どうき）、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	けいれん
頭部	めまい、気を失う
胸部	動悸
手・足	指先や唇のしびれ

【この薬の形は？】

この薬は、シリンジの中に無色澄明の液が入っています。

販売名	容器の形状
ウパシタ 静注透析用 25 μ g シリンジ	
ウパシタ 静注透析用 50 μ g シリンジ	

販売名	容器の形状
ウパシタ 静注透析用 100 μ g シリンジ	
ウパシタ 静注透析用 150 μ g シリンジ	
ウパシタ 静注透析用 200 μ g シリンジ	
ウパシタ 静注透析用 250 μ g シリンジ	
ウパシタ 静注透析用 300 μ g シリンジ	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ウパシカルセトナトリウム水和物
添加剤	塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：株式会社三和化学研究所 (<https://www.skk-net.com/>)

電話：0120-19-8130

受付時間：9時～17時

(土、日、祝日、その他休業日を除く)

プロモーション提携：キッセイ薬品工業株式会社 (<https://www.kissei.co.jp>)

くすり相談センター

電話：0120-007-622

受付時間：9時～17時40分

(土、日、祝日、当社休日を除く)